

Guía del medicamento Azitromicina

1. Introducción

- La azitromicina, conocida como Zithromax o Zmax, es un antibiótico eficaz contra diversas infecciones bacterianas. Trata infecciones respiratorias, infecciones cutáneas, infecciones de oído y enfermedades de transmisión sexual. La azitromicina se utiliza únicamente en infecciones cuya causa está demostrada o se sospecha firmemente que es una bacteria susceptible, para evitar el desarrollo de bacterias resistentes al fármaco.

2. Advertencias

- No utilice Azitromicina si ha tenido ictericia o problemas hepáticos causados por la toma de este medicamento. Avise a su médico si tiene algún problema relacionado con el hígado antes de tomar este medicamento.

3. Antes de tomar este medicamento

- **Alergias:** Evite Azitromicina si es alérgico a ella o a medicamentos similares como claritromicina, eritromicina o telitromicina.

- **Historia Médica:** Informe a su médico sobre cualquier antecedente de enfermedad hepática, enfermedad renal, miastenia gravis, trastorno del ritmo cardíaco, niveles bajos de potasio o síndrome de QT largo.

- **Embarazo y lactancia:** No se espera que la azitromicina dañe al feto, pero informe a su médico si está embarazada o planea estarlo. Se desconocen sus efectos en la leche materna; consulte a su médico en caso de lactancia.

4. Cómo tomar Azitromicina

- Siga estrictamente la prescripción médica. No altere la dosis ni la duración del tratamiento.

- La azitromicina puede tomarse con o sin alimentos.

- En forma líquida, agitar bien y medir la dosis con precisión utilizando la jeringa dosificadora suministrada o una cuchara o taza dosificadora.

- Complete todo el tratamiento. Suspenderlo antes puede aumentar el riesgo de infecciones resistentes a los antibióticos.

- Conservar a temperatura ambiente, lejos de la humedad y el calor. Deseche cualquier medicamento líquido no utilizado después de 10 días.

5. Dosis olvidada y sobredosis

- Dosis olvidada: Tómela en cuanto se acuerde. Si es casi la hora de la siguiente dosis, sátese la dosis olvidada. No tome más medicamento para compensar la dosis olvidada.

- Sobredosis: En caso de sobredosis, busque atención médica de urgencia o llame a la línea de Ayuda Toxicológica 1-800-222-1222.

6. Qué evitar

- Evite tomar antiácidos que contengan aluminio o magnesio 2 horas antes o después de tomar Azitromicina, ya que pueden reducir su eficacia.

- Tenga cuidado con los síntomas de diarrea ya que pueden indicar una nueva infección. No utilice medicamentos antidiarreicos a menos que se lo indique su médico.

- La azitromicina puede aumentar la sensibilidad al sol. Evite la exposición prolongada al sol, las camas solares, y asegúrese de usar protector solar y ropa protectora cuando esté al aire libre.

7. Efectos secundarios y situaciones de emergencia

- Los efectos secundarios comunes incluyen diarrea, náuseas, vómitos, dolor de estómago y dolor de cabeza.

- Busque ayuda médica inmediata si experimenta reacciones alérgicas, reacciones cutáneas graves, síntomas de una reacción grave al medicamento que afecte a varias partes del cuerpo, dolor de estómago intenso, diarrea acuosa o sanguinolenta, latidos cardíacos rápidos o fuertes, dificultad para respirar, problemas hepáticos, o si un bebé que toma Azitromicina se vuelve irritable o vomita mientras come o mama.

Descargo de responsabilidad: Esta guía sólo tiene fines informativos y no debe sustituir al consejo médico profesional. Consulte a su médico para obtener instrucciones y orientación personalizadas basadas en su estado de salud específico.