Instrucciones de Uso y Efectos Secundarios de Cialis Super Active

Uso de Cialis Super Active:

1. **Dosis Recomendada:** La dosis habitualmente recomendada de Cialis Super Active es de una cápsula tomada según sea necesario, preferiblemente antes de la actividad sexual. No se debe tomar más de una dosis en un período de 24 horas.
2. **Cómo Tomarlo:** Ingiera la cápsula entera con un vaso lleno de agua. Puede tomarla con o sin comida, pero es posible que note que su eficacia se reduce si lo toma con una comida rica en grasas.
3. **Inicio de Acción:** Aunque Cialis Super Active actúa más rápido que el Cialis regular, aún es aconsejable tomarlo al menos 30 minutos antes de la actividad sexual.
4. **Duración:** Los efectos pueden durar hasta 36 horas, pero esto no significa que mantendrá una erección durante todo este tiempo. Significa que puede ser capaz de obtener una erección más fácilmente dentro de este período si está sexualmente estimulado.
5. **Almacenamiento:** Guarde Cialis Super Active en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños y mascotas.

Efectos Secundarios de Cialis Super Active:

Como todos los medicamentos, Cialis Super Active puede causar efectos secundarios. No todos los experimentarán, pero es importante estar informado.

Efectos secundarios comunes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas):

- Dolor de cabeza
- Sofocos
- Dolores musculares
- Congestión nasal
- Indigestión

Efectos secundarios poco comunes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):

- Mareos
- Dolor en el estómago o reflujo ácido
- Cambios en la visión o visión borrosa
- Palpitaciones
- Dolor en la espalda

Efectos secundarios raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1,000 personas):

- Pérdida de audición
- Convulsiones
- Erección prolongada y dolorosa (priapismo). Si tiene una erección que dura más de 4 horas, busque atención médica de inmediato.
- Pérdida repentina de visión

Precauciones:

- Si experimenta alguno de los efectos secundarios raros, o si cualquier efecto secundario le preocupa o se prolonga, consulte a un médico de inmediato.
- No combine Cialis Super Active con otros medicamentos para la disfunción eréctil.
- Si tiene problemas cardíacos y experimenta síntomas graves mientras tiene actividad sexual (como mareos, náuseas, o dolor en el pecho), deje de la actividad y busque atención médica.